

BIOSTETICS

Препарат, действующее вещество, титр		Цена с НДС, руб./упак.	Доп.Инф	Срок хранения
МОБИЛИЗАТОРЫ ПИТАНИЯ				
AgroP	Споры штамма <i>Bacillus megaterium</i> B-12463 (титр не менее 1×10^9 КОЕ/мл).	295 руб. за 1л/(при покупке от 10 л) 590 руб. за 1л/(при покупке 1 л)	1-5л (в зависимости от культуры)/га. Мобилизует труднорастворимый фосфор и калий из почвы. В процессе своего роста клетки бактерии растворяют труднодоступные для растений соединения фосфора и калия. Помимо этого Agro P стимулирует корнеобразование, рост растений, выработку биологически активных веществ.	2 года (от 2°C до 25°C)
AgroN	Живые клетки штамма <i>Azospirillum zeae</i> OPN-14 (ВКПМ B-12542) (титр не менее 1×10^9 КОЕ/мл).	295 руб. за 1л/(при покупке от 10 л). 590 руб. за 1л/(при покупке 1 л)	1-5л (в зависимости от культуры)/га. Улучшает азотное питание. Штамм в составе препарата обладает высокой азотфиксирующей активностью. Доказанный азотфиксирующий эффект от 30 до 50 кг/га	12 мес. (от 2-18 °C°); 6 мес. (от 18-25 °C°)
БИОФУНГИЦИДЫ				
Agreex	Конидии* штамма <i>Trichoderma asperellum</i> F-1323 (титр не менее 1×10^8 КОЕ/мл).	318 руб. за 1л/(при покупке от 10 л); 600 руб. за 1л/(при покупке 1 л)	1-5л(в зависимости от культуры)/га. Выделяет порядка 50 антибиотиков, которые борются с комплексом грибных и бактериальных патогенов. Быстрое действие с момента применения; Эффективен как при профилактическом, так и при лечебном применении; Стабилизированный состав (увеличенный срок хранения с сохранением КОЕ на заявленном уровне); Усиленная способность к синтезу антибиотиков и росторегулирующих веществ; Низкие эффективные дозировки.	10 мес (от 2-10 °C°); 6 мес (от 18-25°C°)
БИОИНСЕКТИЦИДЫ				
Biocrode	Споры штамма гриба <i>Beauveria bassiana</i> F-1357 (титр не менее 1×10^8 КОЕ/мл)	348 руб. за 1л/(при покупке от 10 л)	3-5л(в зависимости от культуры)/га. Эффективен против широкого спектра насекомых-вредителей (в том числе против хлопковой совки, капустной моли, белокрылки); активен в отношении не только личинок, но и взрослых насекомых; не оказывает влияния на природных энтомофагов; споры гриба длительное время сохраняются в окружающей среде; совместим с химическими и биологическими инсектицидами и основными химическими гербицидами.	6 мес (от 2-10 °C°); 3 мес (от 10-18°C°) 1 месяц (от 18-25°C°)
БИОДЕСТРУКТОР СТЕРНИ, ПОЧВЕННЫЙ ФУНГИЦИД				
Agrobionic	Конидии штамма <i>Trichoderma asperellum</i> (титр не менее 1×10^8 КОЕ/мл); – активные метаболиты штамма <i>Azospirillum zeae</i> (титр не менее 1×10^6 КОЕ/мл); – активные метаболиты штамма <i>Bacillus megaterium</i> (титр не менее 1×10^6 КОЕ/мл)	315 руб. за 1л/(при покупке от 10 л); 600руб. за 1л/(при покупке 1 л)	0,5-1л(в зависимости от культуры)/га. Отличительной особенностью гриба рода <i>Trichoderma</i> является его гиперпаразитическая активность. Он буквально съедает почвенные фитопатогенные грибы; жидкая препаративная форма без мицелия; широкий спектр активности против фитопатогенных грибов; обладает росторегулирующей и иммуностимулирующей активностью; эффективен в холодное (весна, осень) время года; штамм в основе препарата сохраняет свою активность при низких температурах, в широком диапазоне pH (от 3 до 9), при низкой влажности; используется как деструктор стерни.	10 месяцев (от 2 ° до 10 °C°); 6-8 месяцев (от 10 ° до 18 °C°) 6 месяцев (от 18 ° до 25 °C°)